

Cefenil

CER **DÍAS**
EN LECHE

50 mg/ml POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE PARA BOVINO Y PORCINO
CEFTIOFUR (COMO CEFTIOFUR SÓDICO)

2 DÍAS
DE TIEMPO
DE ESPERA
EN CARNE



ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO PARA EL TRATAMIENTO DE PROCESOS RESPIRATORIOS AGUDOS Y NECROBACILOSIS INTERDIGITAL AGUDA.

CEFTIOFUR 50 mg/ml: CEFALOSPORINA DE 3º GENERACIÓN

ANTIBIÓTICO β LACTÁMICO

0 DÍAS DE SUPRESIÓN EN LECHE

USO IDEAL COMBINADO CON UN AINE PROPORCIONANDO UNA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA EFECTIVA DE AMPLIO ESPECTRO Y UNA REDUCCIÓN DURADERA DE LA INFLAMACIÓN.



| ESPECIES | POSOLÓGIA | POSOLÓGIA DEL PRODUCTO RECONSTITUIDO | INDICACIÓN | FRECUENCIA DE ADMINISTRACIÓN |
|----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Bovinos | 1 mg/ kg | 1 ml/ 50 kg | Enfermedad respiratoria | 1 vez al día con intervalos de 24 horas durante 3-5 días |
| | | | Necrobacilosis interdigital aguda | 1 vez al día con intervalos de 24 horas durante 3 días |

CEFENIL 50 mg/ml POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE PARA BOVINO Y PORCINO. - Composición cualitativa y cuantitativa: un vial de polvo contiene: Cefiotfur (como ceftiofur sódico) 1 g o bien 4 g. Excipientes c.s.p. 1 vial. El disolvente contiene: Agua para preparaciones inyectables Un ml de solución reconstituida contiene: Cefiotfur (como ceftiofur sódico) 50 mg. Forma farmacéutica: Polvo y disolvente para solución inyectable. Polvo: polvo blanco opaco a marrón. Disolvente: solución incolora y transparente. Solución reconstituida: solución transparente y libre de partículas. Especies de destino: Bovino y porcino. Posología y vía de administración: el producto es sólo para administración intramuscular. Debe practicarse la técnica normal de inyección aséptica. Reconstitución Vial de 1g: reconstituir añadiendo 20 ml de agua para preparaciones inyectables. Vial de 4g: reconstituir añadiendo 80 ml de agua para preparaciones inyectables. Número de la autorización de comercialización: 2064. ESP

Cefenil

50 mg/ml POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE PARA BOVINO Y PORCINO
CEFTIOFUR (COMO CEFTIOFUR SÓDICO)

2 DÍAS
DE TIEMPO
DE ESPERA
EN CARNE



●● CEFTIOFUR 50 mg/ml :
CEFALOSPORINA DE TERCERA
GENERACIÓN

●● ANTIBIÓTICO β LACTÁMICO
PARA EL TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
BACTERIANAS.

| ESPECIES | POSOLÓGIA | POSOLÓGIA DEL PRODUCTO RECONSTITUIDO | INDICACIÓN | FRECUENCIA DE ADMINISTRACIÓN |
|----------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| Porcinos | 3 mg/kg | 1 ml/ 16 kg | Enfermedad respiratoria | Una vez al día con intervalos de 24 horas durante 3 días |



CEFENIL_F1.01/10

