

Butomidor®



**Control analgésico
profesional**



Butomidor®

Butorfanol 10 mg/ml

Multifuncional, seguro y eficaz

Analgésico opiáceo con un efecto agonista (receptores kappa) y antagonista (receptores mu)

Inicio del efecto rápido, 15 minutos

Duración efecto desde 30 minutos a 6 horas (gatos)

Registrado para perros y gatos

Butomidor una buena elección para:

- Analgesia postrauma: alivio del dolor inmediato
- Analgesia preventiva: uso en cirugía programada
- Analgesia intraquirúrgica
- Analgesia postquirúrgica: especialmente en pacientes de edad avanzada, jóvenes o cardiopatas.



Dosis en perro

Analgesia: SC, IM, IV
0,25 mg/kg

Sedativo: Asociado a medetomidina
Butomidor: IV, IM 0,1 mg/kg
Medetomidina: IV, IM 0,01 mg/kg

Anestesia: Asociado a medetomidina y ketamina
Butomidor: IM 0,1 mg/kg
Medetomidina: IM, IV 0,025 mg/kg
Ketamina: IM, 5 mg/kg



Dosis en gato

Analgesia: SC, IV
0,4 mg/kg (SC); 0,1 mg/kg (IV)

Sedativo: Asociado a medetomidina
Butomidor: SC 0,4 mg/kg
Medetomidina: SC 0,05 mg/kg

Anestesia: Asociado a medetomidina y ketamina
Butomidor: IV 0,1 mg/kg
Medetomidina: IV 0,04 mg/kg
Ketamina: 1,5 mg/kg





Composición cualitativa y cuantitativa: Butorfanol como tartrato 10 mg/ml

Especies de destino: Caballos, perros y gatos.

Indicaciones de uso:

Perro/gato:

Como analgésico: Para el alivio del dolor visceral moderado como por ejemplo el dolor pre y post quirúrgico así como al dolor post traumático.

Como sedante: En combinación con agonistas $\alpha 2$ -adrenérgicos (medetomidina).

Como pre-anestésico: Parte del régimen de anestesia (medetomidina, ketamina).

Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar para el tratamiento de animales con disfunción severa del hígado y los riñones, en caso de daño cerebral o lesiones orgánicas del cerebro y en animales con enfermedades respiratorias obstructivas, disfunciones del corazón o condiciones espásticas.

Precauciones especiales para su uso en animales:

Debido a sus propiedades antitusivas, el butorfanol puede provocar una acumulación de mucosidad en el tracto respiratorio. Puede apreciarse sedación en los animales tratados. La asociación de butorfanol y $\alpha 2$ -adrenérgicos debe utilizarse con precaución en animales con enfermedad cardiovascular. El uso simultáneo con fármacos anticolinérgicos (p. ej. Atropina) debe ser evaluado. Los gatos deben ser pesados para asegurar que se calcula la dosis correcta. Si se precisan administraciones repetidas, utilizar lugares de inyección diferentes.

Reacciones adversas: Perro/gato: Depresión de los sistemas respiratorio y cardiovascular. Dolor local asociado a la inyección intramuscular. Reducción de la motilidad gastrointestinal. En casos raros, ataxia, anorexia y diarrea. En gatos puede aparecer excitación o sedación, ansiedad, desorientación, disforia y midriasis.

Posología y vía de administración

Perro: Administración intravenosa, subcutánea e intramuscular.

Gato: Administración intravenosa y subcutánea

Perro

Como analgésico: 0,1 – 0,4 mg/kg. Para la analgesia post operatoria, la inyección debe administrarse 15 minutos antes del final de la anestesia para lograr alivio efectivo del dolor durante la fase de recuperación.

Como sedante: Butorfanol: 0,1 mg/kg IV, IM. Medetomidina: 0,01 mg/kg IV, IM

Como pre-anestésico: Butorfanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg pv) IM. Medetomidina: 0,025 mg/kg IM, seguida tras 15 minutos por Ketamina: 5 mg/kg IM.

Gato

Como analgésico: 15 minutos antes de la recuperación 0,4 mg/kg SC ó 0,1 mg/kg IV

Como sedante: Butorfanol: 0,4 mg/kg SC, Medetomidina: 0,05 mg/kg SC

La antagonización de la medetomidina es posible con 0,125 mg atipamezol/kg de peso vivo.

Como pre-anestésico: Butorfanol: 0,1 mg/kg, IV, Medetomidina: 0,04 mg/kg IV, Ketamina: 1,5 mg/kg IV Sólo se puede usar 0,1 mg de atipamezol / kg de peso vivo para la antagonización de la medetomidina cuando la acción de la ketamina ha cesado.

Debe evitarse la inyección intravenosa rápida.

Titular de la autorización de comercialización

Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Austria
www.richter-pharma.at

Nº registro: 2248 esp representante

Laboratorios Karizoo S.A.
Pol. Ind. La Borda 08140
Caldes de Montbui, Barcelona